



Taxonomie van de Patrijzen, kwartels, fazanten en pauwen (Phasianidae)

• Phasianidae

- Afropavo
 - Afropavo congensis (Congopauw)
- Alectoris
 - Alectoris barbara (Barbarijnse patrijs)
 - Alectoris chukar (Aziatische steenpatrijs)
 - Alectoris graeca (Europese steenpatrijs)
 - Alectoris magna (Chinese steenpatrijs)
 - Alectoris melanocephala (Arabische steenpatrijs)
 - Alectoris philbyi (Philby's steenpatrijs)
 - Alectoris rufa (Rode patrijs)
- Ammoperdix
 - Ammoperdix griseogularis (Perzische woestijnpatrijs)
 - Ammoperdix heyi (Arabische woestijnpatrijs)
- Anurophasis
 - Anurophasis monorthonyx (Nieuwguinese bergpatrijs)
- Arborophila
 - Arborophila ardens (Hainanbospatrijs)
 - Arborophila atrogularis (Witwangbospatrijs)
 - Arborophila brunneopectus (Bruinborstbospatrijs)
 - Arborophila cambodiana (Cambodjaanse bospatrijs)
 - Arborophila campbelli
 - Arborophila charltonii (Charltons bospatrijs)
 - Arborophila chloropus (Groenpootbospatrijs)
 - Arborophila crudigularis (Taiwanbospatrijs)
 - Arborophila davidi (Davids bospatrijs)
 - Arborophila diversa
 - Arborophila gingica (Rickets bospatrijs)
 - Arborophila hyperythra (Borneo-bospatrijs)
 - Arborophila javanica (Javaanse bospatrijs)
 - Arborophila mandellii (Roodborstbospatrijs)
 - Arborophila orientalis (Sumatraanse bospatrijs)
 - Arborophila rolli
 - Arborophila rubrirostris (Roodsnavelbospatrijs)
 - Arborophila rufipectus (Boultons boskwartel)
 - Arborophila rufogularis (Roodkeelboskwartel)



- *Arborophila sumatrana*
- *Arborophila torqueola* (Boskwartel)
- *Argusianus*
 - *Argusianus argus* (Argusfazant)
- *Bambusicola*
 - *Bambusicola fytchii* (Bamboe-patrijs)
 - *Bambusicola thoracicus* (Chinese bamboe-patrijs)
- *Bonasa*
 - *Bonasa umbellus* (Kraaghoen)
- *Caloperdix*
 - *Caloperdix oculus* (Gevlekte bospatrijs / Rodebospatrijs)
- *Catreus*
 - *Catreus wallichii* (Wallichfazant)
- *Centrocercus*
 - *Centrocercus minimus*
 - *Centrocercus urophasianus* (Waaierhoen)
- *Chrysolophus*
 - *Chrysolophus amherstiae* (Lady Amherstfazant)
 - *Chrysolophus pictus* (Goudfazant)
- *Coturnix*
 - *Coturnix coromandelica* (Regenkwartel)
 - *Coturnix coturnix* (Kwartel)
 - *Coturnix delegorguei* (Harlekijnkwartel)
 - *Coturnix japonica* (Japanse kwartel)
 - *Coturnix pectoralis* (Stoppelveldkwartel)
 - *Coturnix ypsilophora* (Tasmaanse bruine kwartel)
- *Crossoptilon*
 - *Crossoptilon auritum* (Blauwe oorfazant)
 - *Crossoptilon crossoptilon* (Witte oorfazant)
 - *Crossoptilon harmani* (Tibetaanse oorfazant)
 - *Crossoptilon mantchuricum* (Bruine oorfazant)
- *Dendragapus*
 - *Dendragapus fuliginosus*
 - *Dendragapus obscurus* (Blauw sneeuwhoen)
- *Dendroperdix*
 - *Dendroperdix sephaena* (Kuiffrankolijn)
- *Excalfactoria*
 - *Excalfactoria adansonii* (Afrikaanse dwergkwartel)



- *Excalfactoria chinensis* (Chinese dwergkwartel)
- *Falcipennis*
 - *Falcipennis canadensis* (Bossneeuwhoen)
 - *Falcipennis falcipennis* (Spitsvleugelhoen)
- *Francolinus*
 - *Francolinus francolinus* (Zwarte frankolijn)
 - *Francolinus gularis* (Moerasfrankolijn)
 - *Francolinus pictus* (Bonte frankolijn)
 - *Francolinus pintadeanus* (Chinese frankolijn)
 - *Francolinus pondicerianus* (Grijze frankolijn)
- *Galloperdix*
 - *Galloperdix bicalcarata* (Ceylondwergfazant)
 - *Galloperdix lunulata* (Pareldwergfazant)
 - *Galloperdix spadicea* (Rode dwergfazant)
- *Gallus*
 - *Gallus gallus* (Bankivahoen)
 - *Gallus gallus domesticus* (Kip)
 - *Gallus lafayetii* (Ceylonhoen)
 - *Gallus sonneratii* (Sonnerathoen)
 - *Gallus varius* (Vorkstaarhoen)
- *Haematortyx*
 - *Haematortyx sanguiniceps* (Roodkopbospatrijs)
- *Ithaginis*
 - *Ithaginis cruentus* (Bloedfazant)
- *Lagopus*
 - *Lagopus lagopus* (Moerassneeuwhoen)
 - *Lagopus leucura* (Witstaartsneeuwhoen)
 - *Lagopus muta* (Alpensneeuwhoen)
- *Lerwa*
 - *Lerwa lerwa* (Sneeuwpatrijjs)
- *Lophophorus*
 - *Lophophorus impejanus* (Himalaja-glansfazant)
 - *Lophophorus lhuysii* (Chinese glansfazant)
 - *Lophophorus sclateri* (Witstaartglansfazant)
- *Lophura*
 - *Lophura bulweri* (Bulwers fazant)
 - *Lophura diardi* (Kuifloze prelaatfazant)
 - *Lophura edwardsi* (Edwards fazant)



- *Lophura erythrophthalma* (Vuurrugfazant)
- *Lophura hatinhensis* (Vo quy's fazant)
- *Lophura hoogerwerfi* (Atjehfazant / Hoogerwerf-fazant)
- *Lophura ignita* (Gekuifde vuurrugfazant)
- *Lophura inornata* (Salvadori's fazant)
- *Lophura leucomelanos* (Nepalfazant)
- *Lophura nycthemera* (Zilverfazant)
- *Lophura swinhoii* (Swinhoe's fazant)
- *Lyrurus*
 - *Lyrurus mlokosiewiczi* (Kaukasisch korhoen)
 - *Lyrurus tetrix* (Korhoen)
- *Margaroperdix*
 - *Margaroperdix madagascariensis* (Madagaskarpatrijs)
- *Melanoperdix*
 - *Melanoperdix niger* (Zwarte bospatrijs)
- *Meleagris*
 - *Meleagris gallopavo* (Kalkoen)
 - *Meleagris ocellata* (Pauwkalkoen)
- *Pavo*
 - *Pavo cristatus* (Blauwe pauw)
 - *Pavo muticus* (Groene pauw)
- *Peliperdix*
 - *Peliperdix albogularis* (Witkeelfrankolijn)
 - *Peliperdix coqui* (Coqui-frankolijn)
 - *Peliperdix lathamii* (Lathams frankolijn)
 - *Peliperdix schlegelii* (Schlegels frankolijn)
- *Perdicula*
 - *Perdicula argoondah* (Madrasdwegpatrijs)
 - *Perdicula asiatica* (Frankolijnkwartel)
 - *Perdicula erythrorhyncha* (Bonte dwergpatrijs)
 - *Perdicula manipurensis* (Manipurdwegpatrijs)
- *Perdix*
 - *Perdix dauurica* (Baardpatrijs)
 - *Perdix hodgsoniae* (Tibetaanse patrijs)
 - *Perdix perdix* (Patrijs)
- *Phasianus*
 - *Phasianus colchicus* (Gewone fazant)
 - *Phasianus versicolor* (Groene fazant)



- Polyplectron
 - Polyplectron bicalcaratum (Spiegelpauw)
 - Polyplectron chalcureum (Sumatraanse pauwfazant)
 - Polyplectron germaini (Germain's pauwfazant)
 - Polyplectron inopinatum (Rotschilds pauwfazant)
 - Polyplectron malacense (Maleise spiegelpauw)
 - Polyplectron napoleonis (Palawanpauwfazant / Palawanspiegelpauw)
 - Polyplectron schleiermacheri (Borneopauwfazant / Scleiermacher)
- Pternistis
 - Pternistis adpersus (Roodsnavelfrankolijn)
 - Pternistis afer (Roodkeelfrankolijn)
 - Pternistis ahantensis (Ahanta-frankolijn)
 - Pternistis bicalcaratus (Barbarijnse frankolijn)
 - Pternistis camerunensis (Kameroenfrankolijn)
 - Pternistis capensis (Kaapse frankolijn)
 - Pternistis castaneicollis (Roestkopfrankolijn)
 - Pternistis clappertoni (Clappertons frankolijn)
 - Pternistis erckelii (Erckels frankolijn)
 - Pternistis griseostriatus (Grants frankolijn)
 - Pternistis hartlaubi (Hartlaubs frankolijn)
 - Pternistis harwoodi (Harwoods frankolijn)
 - Pternistis hildebrandti (Hildebrands frankolijn)
 - Pternistis icterorhynchus (Geelsnavelfrankolijn)
 - Pternistis jacksoni (Jacksons frankolijn)
 - Pternistis leucoscepus (Geelkeelfrankolijn)
 - Pternistis natalensis (Natalfrankolijn)
 - Pternistis nobilis (Bamboe-frankolijn)
 - Pternistis ochropectus (Djibouti-frankolijn)
 - Pternistis rufopictus (Grijshalsfrankolijn)
 - Pternistis squamatus (Geschubde frankolijn)
 - Pternistis swainsonii (Swainsons frankolijn)
 - Pternistis swierstrai (Swierstra's frankolijn)
- Ptilopachus
 - Ptilopachus nahani (Nahan-frankolijn)
 - Ptilopachus petrosus (Rotspatrijs)
- Pucrasia
 - Pucrasia macrolopha (Koklasfazant)
- Rheinardia



- Rheinardia ocellata (Gekuifde argusfazant)
- Rhizothera
 - Rhizothera dulitensis
 - Rhizothera longirostris (Indische bospatrijs)
- Rollulus
 - Rollulus rouloul (Roelroel)
- Scleroptila
 - Scleroptila africana (Grijsvleugelfrankolijn)
 - Scleroptila finschi (Finsch' frankolijn)
 - Scleroptila levaillantii (Roodvleugelfrankolijn)
 - Scleroptila levaillantoides (Archers frankolijn)
 - Scleroptila psilolaema (Hooglandfrankolijn)
 - Scleroptila shelleyi (Shelley's frankolijn)
 - Scleroptila streptophora (Kraagfrankolijn)
- Syrmaticus
 - Syrmaticus ellioti (Eliots fazant)
 - Syrmaticus humiae (Hume's fazant)
 - Syrmaticus mikado (Mikado-fazant)
 - Syrmaticus reevesii (Koningsfazant)
 - Syrmaticus soemmerringii (Koperfazant)
- Tetrao
 - Tetrao parvirostris (Rotsauerhoen / Sachalin-auerhoen)
 - Tetrao urogallus (Auerhoen)
- Tetraogallus
 - Tetraogallus altaicus (Altai-berghoen)
 - Tetraogallus caspius (Kaspisch berghoen)
 - Tetraogallus caucasicus (Kaukasisch berghoen)
 - Tetraogallus himalayensis (Himalaya-berghoen)
 - Tetraogallus tibetanus (Tibetaans berghoen)
- Tetraophasis
 - Tetraophasis obscurus (Tibetaans wigstaarhoen)
 - Tetraophasis szechenyii (Roodkeelwigstaarhoen)
- Tetrastes
 - Tetrastes bonasia (Hazelhoen)
 - Tetrastes sewerzowi (Zwartborsthazelhoen)
- Tragopan
 - Tragopan blythii (Blyth tragopan)
 - Tragopan caboti (Cabot tragopan)



- *Tragopan melanocephalus* (Westelijke tragopan)
- *Tragopan satyra* (Satyr tragopan)
- *Tragopan temminckii* (Temminck tragopan)
- *Tympanuchus*
 - *Tympanuchus cupido* (Prairiehoen)
 - *Tympanuchus pallidicinctus* (Klein prairiehoen)
 - *Tympanuchus phasianellus* (Stekelstaarhoen)
- *Xenoperdix*
 - *Xenoperdix udzungwensis*

Citeer dit artikel als: Brouwers, C.I.J. (2010) Patrijzen, kwartels, fazanten en pauwen (Phasianidae). *GEolution*.

<https://www.geolution.nl/dieren/patrijzen-kwartels-fazanten-en-pauwen-phasianidae.htm>